Rubus allegheniensis Porter ex Bailey
Allegheny-Brombeere

Bestimmungsrelevante Merkmale:

Schössling	- **Form**: kantig und gefurcht, suberekt, 1,5-2 m hoch - **Behaarung**: (fast) kahl - **Stieldrüsen**: keine; stark (sub-)sessil drüsig - **Stacheln**: ca. 1-5 pro 5 cm, gerade oder schwach gebogen, bis 3-6(-9) mm lang, grüngelblich
Blätter	- **Blättchenanzahl**: hand- bis etwas fußförmig, 5-zählig - **Behaarung**: oberseits frisch grün, matt, mit 20->50 Haaren pro cm^2, unterseits grün, von auf den Nerven gekämmten, schimmernden Haaren samtig weich - **Endblättchen**: kurz bis lang gestielt (20-46 %), aus tief herzförmigem Grund (breit) eiförmig, allmählich in eine zuletzt etwas abgesetzte, 20-30(-40) mm lange Spitze auslaufend - **Serratur**: mit allmählich zugespitzten schlanken Zähnen sehr eng und gleichmäßig - **Seitenblättchen**: untere (2-)3-5 mm lang gestielt - **Blattstiel**: oberseits behaart und ± stieldrüsig, sonst fast kahl, mit 1-8 zarten, fast geraden, 1-2 mm langen Stacheln
Blütenstand	- **Form**: angenähert oder völlig traubig mit regelmäßig angeordneten, zahlreichen, abstehenden Blütenstielen - **Blätter**: untere 3-5-zählig, Blättchen auffallend lang bespitzt - **Achse**: abstehend dichthaarig und dicht kurz stieldrüsig, fast unbestachelt - **Blütenstiele**: 20-35 mm lang, abstehend behaart und mit zahlreichen, 0,3-0,7 mm langen Stieldrüsen; Stacheln 0-1(-10), gerade, 1-2 mm lang - **Kelch**: grünlich, zurückgeschlagen - **Kronblätter**: weiß, ± eiförmig, 14-18 mm lang, vertrocknet lange haftend - **Staubblätter**: viel länger als die grünlichen Griffel, postfloral auffällig waagerecht ausgebreitet oder zurück gebogen; Antheren kahl - **Fruchtknoten**: kahl

Kurzcharakteristik: Die Kombination der suberekten Wuchsform mit fein gesägten, sehr lang bespitzten Blättchen, dichtdrüsigen Blütenstielen und die postflorale Haltung der Staubblätter unterscheidet diese nordamerikanische Art von den heimischen Brombeeren.

Ähnliche Taxa: *R. sulcatus, R. pergratus, R. nessensis, R. canadensis*

Ökologie und Soziologie: Nordamerikanische Art, die in verschiedenen Sorten als Obststrauch kultiviert wird und meist in gartennahen, gelegentlich auch ortsferneren Lagen verwildert.

Verbreitung: Heimat östliches Nordamerika. - In Europa verwildert nachgewiesen in England, Schweden, Dänemark, Deutschland, CSSR und Polen.



Rubus allegheniensis





Rubus allegheniensis

Blütenstand

Blütenstandsachse

Blüte

Blüte seitlich