

# Rubus cubirianus (H.E. Weber) G.H. Loos

## Kuhbier-Fuchsbeere

(= *R. nessensis* subsp. *cubirianus* H.E.Weber)

Ähnlich *R. scissus*:

Unterschiede:

	<b>scissus</b>	<b>cubirianus</b>
<b>Schössling</b>	- aufrecht	- mehr gebogen
<b>Blätter</b>	- oberseits mit (50-) >100 Haaren pro cm <sup>2</sup> - unterseits fühlbar behaart	- <b>oberseits kahl oder mit 1-17 Haaren pro cm<sup>2</sup></b> - unterseits mit wenigen kurzen Haaren
<b>Blütenstand</b>	- angenähert traubig, nur 5-10-blütig - Blütenstielchen fast kahl bis locker behaart - Kronblätter schmal elliptisch, Breite 46-54% der Länge  - Fruchtknoten behaart  - Fruchtboden behaart	- ziemlich lang - <b>Blütenstielchen mit ziemlich dichten gebogenen Haaren</b> - Kronblätter ziemlich breit eirundlich bis elliptisch, Breite 58-67% der Länge - Fruchtknoten kurzhaarig, später oft kahl - Fruchtboden mit kurzen Haaren bis fast kahl

*Ähnliche Taxa:* *R. scissus*

*Ökologie und Soziologie:* nemophil, in Wäldern und an schattigen Waldrändern

*Verbreitung:* In Deutschland zerstreut und recht lokal in West-Niedersachsen.