


Rubus Hennstedt1

Hennstedt1 Brombeere

Bestimmungsrelevante Merkmale:

Schössling	- Form: stumpfkantig, stellenweise bereift - Behaarung: stärker behaart - Stieldrüsen: zahlreich - Stacheln: zahlreich in unterschiedlichen Größen, größere 3-6 mm lang, gerade bis leicht gekrümmt, geneigt; kleinere Stachelchen und Stachelhöcker als Übergänge zu Drüsenborsten
Blätter	- Blättchenanzahl: 3-zählig - Behaarung: oberseits zerstreut bis mäßig behaart, unterseits grünlich, relativ weich behaart - Endblättchen: kurz gestielt, herzförmig (mäßig), ziemlich geradlinig in eine kurze Spitze auslaufend - Serratur: gleichmäßig, einige Zähne schwach auswärts gekrümmt - Blattstiel: mit zahlreichen gekrümmten, z.T. über 3 mm langen Stacheln; mit Stieldrüsen
Blütenstand	- Blätter: in den ersten 3 cm beginnend - Achse: deutlich behaart, mit zahlreichen Stieldrüsen; Stacheln in verschiedenen Größen mit Übergängen zu Drüsenborsten, nadelig dünn, gerade bis (schwach) gebogen, z.T. über 3 mm lang, dicht stehend - Blütenstiele: bis 1,5 cm lang, abstehend behaart mit zahlreichen Stieldrüsen, Stachelanzahl 5 - 15, schwach gekrümmt, z.T. über 3 mm lang - Kelch: Kelch grün bis graugrün, zurückgeschlagen, mit zahlreichen roten Stieldrüsen und Stacheln - Kronblätter: weiß - Staubblätter: die grünen Griffel überragend, Antheren kahl - Fruchtknoten: kahl

Verbreitung: bisher nur im Raum Hennstedt gefunden



Lokalart in Schleswig-Holstein, kommt in Mecklenburg-Vorpommern nicht vor.



Rubus Hennstedt1






Blütenstand



Blütenstandsachse



Blüte



Blüte seitlich