

Rubus histrionicus Plieninger

Schauspieler-Haselblattbrombeere

Unterscheidungsmerkmale zwischen *Rubus histrionicus* und *Rubus holandrei* (grossus)
(nach Plieninger in: carolinea 69, Karlsruhe 2011, S. 15)

Merkmale	<i>R. histrionicus</i>	<i>R. holandrei</i> (grossus)
Blattfärbung	lebhaft gelbgrün	dunkelgrün
Blattoberseite	oberseits ± dicht behaart	± kahl
Blattunterseite	durch dichten Besatz mit Sternhaaren grau- bis weißfilzig	ohne Sternhaare oder nur schwach filzig
Blattrand	deutlich schärfer gesägt	
Blütenstände	durch längere Seitenäste und Blütenstiele deutlich lockerer	

Unterscheidungsmerkmale zwischen *Rubus histrionicus* und *Rubus wahlbergii*
(nach Plieninger in: carolinea 69, Karlsruhe 2011, S. 15)

Merkmale	<i>R. histrionicus</i>	<i>R. wahlbergii</i>
Blattoberseite	oberseits ± dicht behaart	± kahle
Blattunterseite	durch dichten Besatz mit Sternhaaren grau- bis weißfilzig	Filzbehaarung lockerer

Unterscheidungsmerkmale zwischen *Rubus histrionicus* und *Rubus scabrosus*
(nach Plieninger in: carolinea 69, Karlsruhe 2011, S. 15)

Merkmale	<i>R. histrionicus</i>	<i>R. scabrosus</i>
Schössling	mit Stieldrüsen	ohne Stieldrüsen

Unterscheidungsmerkmale zwischen *Rubus histrionicus* und *Rubus appropinquatus*
(nach Plieninger in: carolinea 69, Karlsruhe 2011, S. 15)

Merkmale	<i>R. histrionicus</i>	<i>R. appropinquatus</i>
Blattfarbe	leuchtend gelbgrün	matt grün
Blattunterseite	weißfilzig	nur schwach sternhaarig
Blattspitze	5-10 mm lang	10-15 mm lang
Schössling	7-12(-15) pro 5 cm zunächst mit bis zu 10 Haaren pro cm Seite, später meist verkahlend	5-9(-12) pro 5 cm zunächst mit wenigen Haaren, bald verkahlend