Rubus x idaeoides Ruthe
Bastard-Brombeere

Bestimmungsrelevante Merkmale:

Schössling	- **Form**: ± bogig bis kriechend, stark bereift - **Behaarung:** kahl - **Stieldrüsen**: keine - **Stacheln**: ± dunkelviolett, meist dicht stehend
Blätter	- **Blättchenanzahl**: 3-zählig bis gefingert oder gefiedert 5-7-zählig - **Behaarung**: unterseits filzig - **Endblättchen:** - **Serratur**: - **Seitenblättchen**: - **Blattstiel**:
Blütenstand	- **Form**: - **Blätter:** - **Achse**: - **Blütenstiele**: - **Kelch**: - **Kronblätter**: weiß, klein - **Staubblätter**: - **Fruchtknoten**:

Kurzcharakteristik: Auffälligstes Kennzeichen von *Rubus x idaeoides* ist die völlige Sterilität, selten werden einzelne schwarzrote Teilfrüchte ausgebildet.

Ähnliche Taxa: *R. caesius, R. idaeus*

Ökologie und Soziologie: Im Überschneidungsbereich der Standorte der Stammeltern, besonders in Gebüschen (Knicks), an Hecken.

Verbreitung: Zwischen den Eltern wohl in deren gesamten gemeinsamen Wuchsgebiet verbreitet, in SH häufig, in Mecklenburg-Vorpommern zerstreut.



Rubus x idaeoides

Rubus x idaeoides kommt in Mecklenburg-Vorpommern zerstreut vor, doch liegt keine Verbreitungskarte vor.

Rubus x idaeoides

Blütenstand

Blütenstandsachse

Blüte

Blüte seitlich