


Rubus imbricatus Hort.

Dachziegelähnliche Brombeere

Bestimmungsrelevante Merkmale:

Schössling	- Form: 5-9 mm dick, eckig mit flachen oder leicht gefurchten Seiten - Behaarung: fast kahl bis stark zerstreut behaart - Stieldrüsen: keine - Stacheln: 4-12 pro Internodium, manchmal leicht gebogen, 5-7 mm lang
Blätter	- Blättchenanzahl: 3-5-zählig, Blättchen überlappend - Behaarung: oberseits schwach bis mäßig behaart, unterseits graugrün, weich behaart, manchmal leicht filzig - Endblättchen: aus herzförmiger Basis breit verkehrt eiförmig bis fast kreisrund, plötzlich ziemlich lang zugespitzt - Serratur: periodisch, gesägt, mit (fast) geraden Zähnen - Seitenblättchen: untere (fast) sitzend - Blattstiel: viel länger als die unteren Blättchen, mit 4-10 gebogenen Stacheln
Blütenstand	- Form: zylindrisch - Blätter: ohne - Achse: dünnfilzig, drüsenlos, mit 0-4 Stacheln - Blütenstiele: filzig, ohne längere Haare, ohne Stieldrüsen, mit 2-5 Stacheln, 4-6 mm lang - Kelch: zurückgeschlagen, stachellos - Kronblätter: blassrosa bis weiß - Staubblätter: länger als die grünen Griffel, Antheren (fast) kahl - Fruchtknoten: behaart

Verbreitung: nur randlich am W-Niederrhein entlang der holländischen Grenze, dort auch auf holländischer Seite an der Maas; Hauptverbreitung Großbritannien und NW-Frankreich, vermutlich auch in Belgien.



Rubus imbricatus



Blütenstand



Blütenstandsachse



Blüte



Blüte seitlich