

Rubus immodicus A. Schumacher ex H. E. Weber

Maßlose Brombeere

Differentialmerkmale: (nach Heinrich E. Weber in: Osnabrücker naturwiss. Mitt. 17, 1991, S. 189ff.)

Im Gegensatz zu *Rubus galeatus* besitzt *Rubus immodicus*

- kahle, kaum sitzdrüsige, dickere Schösslinge
- unterseits nicht fühlbar behaarte Blätter
- am Grunde herzförmige Endblättchen
- gleichmäßiger mit mehr abgerundeten Zähnen gesägte Endblättchen
- viel kürzer gestielte untere Seitenblättchen
- zurückgeschlagene Kelchblätter
- größere Kronblätter
- weißlich-grüne (an der Basis nicht gerötete) Griffel
- dichthaarige Fruchtknoten.

Rubus macer besitzt im Gegensatz zu *Rubus immodicus*

- behaarte, dichter bestachelte Schösslinge
- am Grunde abgerundete Endblättchen
- 3-5 mm lang gestielte untere Seitenblättchen
- im Blütenstand 2-10 mm lang gestielte (mittlere) Seitenblättchen
- behaarte Antheren
- kahle Fruchtknoten.

Im Gegensatz zu *Rubus macrophyllus* besitzt *Rubus immodicus*

- kahle Schösslinge.

Im Gegensatz zu *Rubus sulcatus* besitzt *Rubus immodicus*

- kurz gestielte untere Seitenblättchen
- dichthaarige Fruchtknoten.