

Rubus iuvenis BEEK

= **Rubus ignoratiformis** H. E. Weber

Jugendliche Brombeere

aus H.E.Weber in: Abhandl. aus dem Westfäl. Museum für Naturkunde, 1985, S. 375

Exemplarische Belege:

Deutschland:

Westfalen:

- 4511.44: Kieferngehölz an der Straße östl. Reingsten, 28.8.1975, WEBER (We)
- 4609.44: Lindenberg nördl. Schwelm, südl. der Straßenkreuzung, 9.8.1977, WEBER(We)
- 4613.43: Illingheim am Sorpesee, oberhalb des Schwimmbads, 15.8.1977, WEBER (We)
- 4710.24: Straße von Breckerfeld nach Rüggebein, Gasthaus nahe der Bachbrücke, 6.8.1981, WEBER (We)
- 4811.31: Südl. Heukelbach bei Klüppelberg, 16.8.1982, WEBER (We)
- 4815.31: An der B 236 bei Haus Hilmeke nahe Saalhausen, 14.8.1977, WEBER (We)
- 5012.24: Nordwestl. Büchen an der Straße nach Hillmicke, 27.8.1975, WEBER (We).

Unterscheidet sich von *R. ignoratus* durch folgende Merkmale:

aus H.E.Weber in: Abhandl. aus dem Westfäl. Museum für Naturkunde, 1985, S. 374

Schössling stets mit (oft ziemlich dichten) abstehenden Haaren und am Grunde stärker verbreiterten, gelblichen, meist zahlreicheren Stacheln.

Blütenstandsachse mit dichteren und breiteren gelblichen Stacheln. **Blütenstiele** mit meist 15-25, zum Grunde hin breiteren, nicht nadeligen, gelblichen oder rotfüßigen, meist etwas gekrümmten Stacheln. **Fruchtknoten** an der Spitze behaart.