

Rubus poliothyrsus A. Beek

Graurispige Brombeere

Bestimmungsrelevante Merkmale:

Schössling	- Form: - Behaarung: mit > 20 Haaren pro cm - Stieldrüsen: keine - Stacheln: zu 5-12 pro 5 cm, geneigt oder gekrümmt bis sichelförmig, 4-8 mm lang
Blätter	- Blättchenanzahl: 5-zählig - Behaarung: oberseits kahl oder schwach behaart, unterseits graugrün bis grauweiß filzig - Endblättchen: schmal eiförmig bis rhombisch oder umgekehrt eirundlich, mit kaum bis deutlich abgesetzter Spitze - Serratur: flach, aber deutlich periodisch, mit scharfen Zähnen - Blattstiel: mit 7-15 gekrümmten Stacheln
Blütenstand	- Form: verlängert schmal zylindrisch, mit schmaler Spitze - Blätter: oben blattlos - Achse: mit 0-2 geneigten bis gekrümmten, 1-3 mm langen Stacheln pro 5 cm - Blütenstiele: mit 0-3 abstehenden Stacheln - Kelch: abstehend - Kronblätter: weiß - Staubblätter: Staubblätter kaum länger als die gelblich-grünen Stacheln; Antheren kahl - Fruchtknoten: dicht behaart

Ökologie und Soziologie: Wiesen- und Wegränder (an offeneren Stellen als *R. chloocladus*)

Verbreitung: Nur Einzelfunde in Nordrhein-Westfalen bei Anholt, aber sicherlich auch z. B. rund um Bad Bentheim; [Hauptverbreitung O-Niederlande (O-Gelderland), disjunkt in SW-Niederlande (Brabant), NO-Frankreich und N-Belgien]