

Rubus pseudincisor H. E. Weber **Falsche Eingeschnittene Haselblattbrombeere**

Differentialmerkmale: ((nach H.E. Weber in: Drosera 1/2, 1991, S. 107)

R. pseudincisor kann leicht mit **Rubus incisor** verwechselt werden.

	incisor	pseudincisor
Schösslingsstacheln:	Anzahl pro 5 cm: (0-)2-5(-7) Länge: 2-3(-4) mm	Anzahl pro 5 cm: (6-)7-15(-20) Länge: 4,5(-5) mm
Stacheln am Blattstiel:	Anzahl: 5-11	Anzahl: 10-18
Stacheln an der Blütenstandsachse (5-10 cm unterhalb der Spitze)	Anzahl: 0-5(-7) Länge: 2-2,5(-3) mm	Anzahl: 6-17 Länge: 4-4,5
Stacheln an den Blütenstielen:	Anzahl: 0-3 Länge: 1,5-2 mm	Anzahl: 3-10 Länge: bis 3 mm
Endblättchen (lebend)	konvex rundlich	lebend ± flach (umgekehrt) eiförmig
Nebenblätter	1-2 mm breit	meist 2-5 mm breit
Blütenstand	sperrig fast ebensträußig endend	schmal pyramidal bis zylindrisch
Kronblätter	weiß, schmaler	blass rosa, rundlich