

Rubus pyramidatus P.J. Müller Deister-Brombeere

Bestimmungsrelevante Merkmale:

Schössling	- Form: dunkelfarbig (wie bei <i>R. vestitus</i>) - Behaarung: dicht behaart - Stieldrüsen: unregelmäßig verteilt
Blätter	- Blättchenanzahl: 3-5-zählig - Behaarung: oberseits behaart, unterseits meist etwas schimmernd weichhaarig, ohne Sternfilz - Endblättchen: aus abgerundetem oder schwach herzförmigem Grund verkehrt eiförmig, mit etwas augesetzter 10-13 mm langer Spitze - Serratur: nur etwa 1-1,5 mm tief gesägt
Blütenstand	- Form: regelmäßig pyramidal - Achse: mit geneigten oder schwach gekrümmten, dünnen, bis 4-5 mm langen Stacheln - Blütenstiele: 15(-20) mm lang, kurz filzig-wirrhaarig, mit zahlreichen 0,3(-0,5) mm langen Stieldrüsen - Kronblätter: rosarot - Staubblätter: Antheren kahl - Fruchtknoten: ziemlich dicht behaart

Kurzcharakteristik:

Ähnliche Taxa:

Ökologie und Soziologie:

Verbreitung: Regionalsippe in Niedersachsen im Raum westlich von Hannover (vor allem im Deister und im Österwald)