## **Rubus pyramidatus** P.J. Müller **Deister-Brombeere**

## Bestimmungsrelevante Merkmale:

Schössling	- Form: dunkelfarbig (wie bei R. vestitus)
	- Behaarung: dicht behaart
	- Stieldrüsen: unregelmäßig verteilt
	- Stacheln: zu 5-10 pro 5 cm, mit roter Basis, gerade, geneigt oder gekrümmt, bis 6-
	7 mm lang
Blätter	- Blättchenanzahl: 3-5-zählig
	- <b>Behaarung</b> : oberseits behaart, unterseits meist etwas schimmernd weichhaarig, ohne Sternfilz
	- <b>Endblättchen</b> : aus abgerundetem oder schwach herzförmigem Grund verkehrt eiförmig, mit etwas augesetzter 10-13 mm langer Spitze
	- Serratur: nur etwa 1-1,5 mm tief gesägt
Blütenstand	- Form: regelmäßig pyramidal
	- <b>Achse</b> : mit geneigten oder schwach gekrümmten, dünnen, bis 4-5 mm langen Stacheln
	- <b>Blütenstiele</b> : 15(-20) mm lang, kurz filzig-wirrhaarig, mit zahlreichen 0,3(-0,5) mm langen Stieldrüsen
	- Kronblätter: rosarot
	- Staubblätter: Antheren kahl
	- Fruchtknoten: ziemlich dicht behaart

Ökologie und Soziologie: auf kalkfreiem Sand

*Verbreitung:* Regionalart im nördlichen Weserbergland südwestlich von Hannover. Lokal, aber oft häufig, vor allem im Deister, Kleinen Deister, Osterwald und Ith; nördlich bis westlich von Hannover.