


Rubus roberti Matzke-Hajek **Roberts Brombeere**

Bestimmungsrelevante Merkmale:

Schössling	- Form: kantig, striemig, weinrötlich - Behaarung: meist wenig behaart - Stieldrüsen: zahlreich - Stacheln: kräftig, aus breitem Fuß bis 5mm lang, geneigt, gerade bis leicht gebogen
Blätter	- Blättchenanzahl: 5-zählig - Behaarung: oberseits mit 10-20 Haaren pro cm² besetzt, verkahlend, unterseits meist grauweiß filzig und fühlbar behaart - Endblättchen: mäßig lang gestielt, schmal elliptisch bis fast rhombisch, mit ± keilförmiger Basis in eine 15-20 mm lange Spitze ausgezogen - Serratur: grob periodisch, 3-5 mm tief, mit längeren, auswärts gebogenen Hauptzähnen - Seitenblättchen: untere meist nur 2-3 mm lang gestielt
Blütenstand	- Form: stumpf kegelig - Blätter: oben auf 5-10 cm unbeblättert - Blütenstiele: stieldrüsiger - Kronblätter: weiß bis blassrosa - Fruchtknoten: kahl

Ähnliche Taxa: *R. radula* (*R. roberti* mit behaarten Blattoberseiten und gröberer Serratur mit längeren Hauptzähnen; oft auch weniger stieldrüsiger)

Verbreitung: Regionalart des Rheinischen Schiefergebirges mit Vorkommen in Rheinland-Pfalz, Hessen und Luxemburg.



Rubus roberti



Blütenstand



Blütenstandsachse



Blüte



Blüte seitlich